

# A MENINGOCOCCUS ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK

LÉPJEN MOST.  
LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS.



A védőoltás védelmet nyújthat  
a meningococcus okozta  
megbetegedés ellen!

A következő cégek  
támogatásával:

# Mi az a meningococcus okozta betegség?

A meningococcus okozta betegség egy életveszélyes bakteriális fertőzés, amely különösen drámai lefolyású is lehet. A meningococcusok elsősorban agyhártyagyulladást (meningitist) vagy vérmérgezést (szepszist) okoznak.


A baktérium az ember orrgaratában található meg; a fertőzés csókolózással, köhögéssel vagy tüsszentéssel terjed.

A lakosság körülbelül 10%-a hordozza tünetmentesen a meningococcut, a baktérium azonban ekkor is képes másokat megfertőzni.



Ritka esetekben a meningococcus megtámadja a szervezetet és invazív betegséget okoz. A fejletlen immunrendszerük miatt a csecsemők esetében nagyobb a meningococcus okozta betegség kockázata.

# A meningococcus szerocsoportjainak eloszlása Ausztriában a 2015. és 2019. közötti időszakban



- ▶ A meningococcusnak különböző szerocsoportjai léteznek. A meningococcus 5 fő szerocsoportja (A, B, C, W és Y) közül Ausztriában a B és a C szerocsoport okozza a legtöbb megbetegedést.
- ▶ 2010 és 2020 között 443 meningococcus okozta megbetegedést jelentettek Ausztriában, amely közül 53 végződött halállal.



A meningococcus okozta megbetegedések egynegyede a gyermekek első életévében fordul elő. Ebből jól látható, hogy miért kiemelkedően fontos, hogy a csecsemők a lehető leghamarabb megkapják a védőoltást.

# A meningococcus okozta betegség ritka, de életveszélyes betegség



Az 1 év alatti csecsemők különösen veszélyeztetettek. A csecsemők és serdülőkorú gyermekek egyaránt nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve.



# A meningococcus okozta betegség elsőre nehezen diagnosztizálható

A meningococcus okozta betegséget azonnal intenzív ellátással kell kezelni, mivel gyorsan életveszélyessé válhat. Sajnos az első tüneteket gyakran túl későn veszik észre, mivel azok az influenzára hasonlítanak.

## Gyakori tünetei



magas láz



hányás



erős fejfájás



nyakmerevség



fényérzékenység



letargia



vöröses, lilás  
bőrkiütések

Gyakori tünetek csecsemők esetén:  
harsány sírás, feszes vagy kidudorodó  
kutacs, merev vagy petyhüdt test.

Az úgynevezett „pohárteszt“ fontos  
segítség lehet a diagnosztika során:  
A meningococcus okozta fertőzés  
általában vöröses-lilás, kezdetben  
csak pontszerű bőrfoltok formájában,  
magas lázzal együtt jelentkezik. Más  
kiütésekkel ellentétben ezek a pontok  
nem tűnnek el, ha egy átlátszó  
pohárral erősen megnyomja őket.

Meningococcus okozta szepszis:  
A kiütések nem tűnnek el.  
Azonban NEM szabad megvárni,  
hogy a kiütés megjelenjen! Nem  
minden meningococcus okozta  
megbetegedésnél fordul elő,  
a megjelenése pedig már az  
előrehaladott betegség jele.




**Bármilyen gyanú esetén azonnal  
forduljon orvoshoz!**

(Fotók: © Prof. Werner Zenz)

# A meningococcus okozta betegség egy gyors lefolyású betegség

A betegség 24 órán belül halálos lehet.



Példa a meningococcus okozta fertőzés lefolyására


## A meningococcus okozta betegség halálos is lehet

Ausztóriában a lehető legjobb orvosi ellátás ellenére az invazív meningococcus fertőzések **mintegy 10%-a** halálos kimenetelű.



## A meningococcus okozta betegség súlyos következményekkel járhat

A túlélők közül akár minden ötödik túlélőnél lehetnek olyan maradandó következmények, mint például az amputáció, az agykárosodás vagy a sükettség.



# A meningococcus okozta betegség megelőzhető


Ne várjon! A meningococcus okozta betegség elleni lehető legjobb védelemmel kapcsolatban kérdezze meg orvosát!



Milyen védelemre van szüksége a gyermekeknek a meningococcus okozta betegséggel szemben?

Az idősebb gyermekeim is védettek a meningococcus okozta betegséggel szemben?

Különböző vakcinák léteznek,  
amelyek a meningococcus  
különböző csoportjai ellen  
nyújtanak védelmet:



- ▶ A meningococcus B elleni védőoltás alkalmazása minden gyermek és serdülő számára a lehető legkorábban ajánlott; az oltást már a 2. hónapot betöltött babák is felvehetik – az emlékeztető oltások pedig 25 éves korig adhatók.
- ▶ A meningococcus C elleni védőoltás a csecsemők számára a lehető legkorábban, a 13. hónaptól ajánlott.
- ▶ Az A, C, W és Y szerocsoportok elleni kombinált védőoltás gyermekek és serdülők számára a 10. életévük betöltésétől kezdődően ajánlott.



A meningococcus okozta betegség elleni lehető  
legjobb védelemmel kapcsolatban kérdezze  
meg orvosát!

Ez a brosúra több nyelven tölthető le.



Türkçe | Turkish  
українська | Ukrainian  
Magyar | Hungarian  
Српски | Serbian  
ايجبرع | Arabic

 [facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz](https://facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz)

 [instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz](https://instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz)



[www.meningokokken-erkrankung.at](http://www.meningokokken-erkrankung.at)

**GlaxoSmithKline Pharma GmbH**

Wienerbergstraße 7, 5. Stock  
1100 Wien, Österreich

NP-AT-MNU-BROC-230006, 05/2023